

正誤表(赤文字を修正)

ページ	正	誤
2	対象期間中の脳・心臓疾患による公務災害認定事案 226 件(うち死亡事案 96 件(42.5%))のうち、男性が 190 件(84.1%)を占め、女性が 36 件(15.9%)と男性が8割以上を占めた。	対象期間中の脳・心臓疾患による公務災害認定事案 226 件(うち死亡事案 84 件(37.2%))のうち、男性が 190 件(84.1%)を占め、女性が 36 件(15.9%)と男性が8割以上を占めた。
2	決定時疾患名では、心・血管疾患は 84 件(37.2%)、脳血管疾患は 142 件(62.8%)、であり、心・血管疾患は心筋梗塞 29 件(12.8%)、心停止(心臓性突然死を含む。)23 件(10.2%)、重症の不整脈(心室細動等)15 件(6.6%)、大動脈解離 13 件(5.8%)、狭心症3件(1.3%)、肺塞栓症1件(0.4%)であった。	決定時疾患名では、心・血管疾患は 84 件(37.2%)、脳血管疾患は 142 件(62.8%)、であり、心・血管疾患は心筋梗塞 29 件(12.8%)、心停止(心臓性突然死を含む。)22 件(9.7%)、重症の不整脈(心室細動等)15 件(6.6%)、大動脈解離 13 件(5.8%)、狭心症4件(1.8%)、肺塞栓症1件(0.4%)であった。
11	生存・死亡別でみると、男女総数では、死亡事案は全体の約4割(96/226 件、42.5%)であり、男女別でみると、男性が約5割(87/190 件、45.8%)、女性が約3割(9/36 件、25.0%)であった。	生存・死亡別でみると、男女総数では、死亡事案は全体の約4割(84 /226 件、37.2%)であり、男女別でみると、男性が約4割(77/190 件、40.5%)、女性が約2割(7/36 件、19.4%)であった。
11	死亡事案 96 件の平均年齢(標準偏差)は、男性(87 件)が 45.9(9.0)歳、女性(9件)が 48.0(5.2)歳であった。	死亡事案 84 件の平均年齢(標準偏差)は、男性(77件)が 46.0 (9.4)歳、女性(7件)が 49.4 (4.1)歳であった。
13	心・血管疾患では、心筋梗塞 29 件(12.8%)、心停止(心臓性突然死を含む。)23 件(10.2%)、重症の不整脈(心室細動等)15 件(6.6%)、大動脈解離 13 件(5.8%)、狭心症3件(1.3%)、肺塞栓症1件(0.4%)の順であり、脳心 R3基準から新たに追加された重篤な心不全の事案はなかった。	心・血管疾患では、心筋梗塞 29 件(12.8%)、心停止(心臓性突然死を含む。)22 件(9.7%)、重症の不整脈(心室細動等)15 件(6.6%)、大動脈解離 13 件(5.8%)、狭心症4件(1.8%)、肺塞栓症1件(0.4%)の順であり、脳心 R3基準から新たに追加された重篤な心不全の事案はなかった。
67	公務災害認定事案の例としては、脳・心臓疾患の職員区分別の職務従事状況では「消防職員」と「清掃事業職員」を除き『日常の職務に比較して特に過重な職務に従事(長時間労働)』が大半を占め、精神疾患・自殺の職員区分別・出来事の該当状況について、「その他の職員(一般職員等)」では『仕事の量(勤務時間の長さ)』が、「義務教育学校職員」では『住民等との公務上での関係』が多く認められるなどと職種により異なる状況が改めて確認された。	公務災害認定事案の例としては、脳・心臓疾患の職員区分別の職務従事状況では「消防職員」と「運輸事業職員」を除き『日常の職務に比較して特に過重な職務に従事(長時間労働)』が大半を占め、精神疾患・自殺の職員区分別・出来事の該当状況について、「その他の職員(一般職員等)」では『仕事の量(勤務時間の長さ)』が、「義務教育学校職員」では『住民等との公務上での関係』が多く認められるなどと職種により異なる状況が改めて確認された。

(図表1-1-1 脳・心臓疾患の男女別・年齢別の事案数(請求時、発症時、死亡時):公務上)

(正)

	男性		女性		総計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性別	190	(84.1)	36	(15.9)	226	(100.0)
請求時年齢 [M, SD]	[47.8, 9.0]		[47.1, 9.1]		[47.6, 9.0]	
発症時年齢 [M, SD]	[47.1, 9.1]		[46.1, 8.6]		[46.9, 9.0]	
20~29歳	8	(4.2)	4	(11.1)	12	(5.3)
30~39歳	30	(15.8)	3	(8.3)	33	(14.6)
40~49歳	64	(33.7)	13	(36.1)	77	(34.1)
50~59歳	79	(41.6)	16	(44.4)	95	(42.0)
60~69歳	8	(4.2)	0	(0.0)	8	(3.5)
70歳以上	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
合計	190	(100.0)	36	(100.0)	226	(100.0)
死亡時年齢 [M, SD]	[45.9, 9.0]		[48.0, 5.2]		[46.1, 8.7]	
20~29歳	4	(4.6)	0	(0.0)	4	(4.2)
30~39歳	16	(18.4)	1	(11.1)	17	(17.7)
40~49歳	30	(34.5)	4	(44.4)	34	(35.4)
50~59歳	36	(41.4)	4	(44.4)	40	(41.7)
60~69歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
70歳以上	1	(1.1)	0	(0.0)	1	(1.0)
合計	87	(100.0)	9	(100.0)	96	(100.0)

(誤)

	男性		女性		総計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性別	190	(84.1)	36	(15.9)	226	(100.0)
請求時年齢 [M, SD]	[47.8, 9.0]		[47.1, 9.1]		[47.6, 9.0]	
発症時年齢 [M, SD]	[47.1, 9.1]		[46.1, 8.6]		[46.9, 9.0]	
20~29歳	8	(4.2)	4	(11.1)	12	(5.3)
30~39歳	30	(15.8)	3	(8.3)	33	(14.6)
40~49歳	64	(33.7)	13	(36.1)	77	(34.1)
50~59歳	79	(41.6)	16	(44.4)	95	(42.0)
60~69歳	8	(4.2)	0	(0.0)	8	(3.5)
70歳以上	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
合計	190	(100.0)	36	(100.0)	226	(100.0)
死亡時年齢 [M, SD]	[46.0, 9.4]		[49.4, 4.1]		[46.3, 9.1]	
20~29歳	4	(5.2)	0	(0.0)	4	(4.8)
30~39歳	15	(19.5)	0	(0.0)	15	(17.9)
40~49歳	24	(31.2)	3	(42.9)	27	(32.1)
50~59歳	33	(42.9)	4	(57.1)	37	(44.0)
60~69歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
70歳以上	1	(1.3)	0	(0.0)	1	(1.2)
合計	77	(100.0)	7	(100.0)	84	(100.0)

(図表1-2-1 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の決定時疾患名の該当状況※:公務上)

(正)


決定時疾患名	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (103件)		女性 (27件)		男性 (87件)		女性 (9件)		(190件)		(36件)		(226件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1 心・血管疾患	23	(22.3)	2	(7.4)	58	(66.7)	1	(11.1)	81	(42.6)	3	(8.3)	84	(37.2)
(1) 狭心症	2	(1.9)	0	(0.0)	1	(1.1)	0	(0.0)	3	(1.6)	0	(0.0)	3	(1.3)
(2) 心筋梗塞	5	(4.9)	0	(0.0)	24	(27.6)	0	(0.0)	29	(15.3)	0	(0.0)	29	(12.8)
(3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)	2	(1.9)	0	(0.0)	21	(24.1)	0	(0.0)	23	(12.1)	0	(0.0)	23	(10.2)
(4) 重症の不整脈 (心室細動等)	9	(8.7)	0	(0.0)	6	(6.9)	0	(0.0)	15	(7.9)	0	(0.0)	15	(6.6)
(5) 重篤な心不全	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
(6) 肺塞栓症	0	(0.0)	1	(3.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.8)	1	(0.4)
(7) 大動脈解離	5	(4.9)	1	(3.7)	6	(6.9)	1	(11.1)	11	(5.8)	2	(5.6)	13	(5.8)
2 脳血管疾患	80	(77.7)	25	(92.6)	29	(33.3)	8	(88.9)	109	(57.4)	33	(91.7)	142	(62.8)
(1) くも膜下出血	18	(17.5)	6	(22.2)	20	(23.0)	4	(44.4)	38	(20.0)	10	(27.8)	48	(21.2)
(2) 脳出血	37	(35.9)	9	(33.3)	7	(8.0)	4	(44.4)	44	(23.2)	13	(36.1)	57	(25.2)
(3) 脳梗塞	25	(24.3)	10	(37.0)	2	(2.3)	0	(0.0)	27	(14.2)	10	(27.8)	37	(16.4)
(4) 高血圧性脳症	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

(誤)


決定時疾患名	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (113 件)		女性 (29 件)		男性 (77 件)		女性 (7 件)		(190件)		(36件)		(226件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1 心・血管疾患	29	(25.7)	2	(6.9)	52	(67.5)	1	(14.3)	81	(42.6)	3	(8.3)	84	(37.2)
(1) 狭心症	2	(1.8)	0	(0.0)	2	(2.6)	0	(0.0)	4	(2.1)	0	(0.0)	4	(1.8)
(2) 心筋梗塞	8	(7.1)	0	(0.0)	21	(27.3)	0	(0.0)	29	(15.3)	0	(0.0)	29	(12.8)
(3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)	2	(1.8)	0	(0.0)	20	(26.0)	0	(0.0)	22	(11.6)	0	(0.0)	22	(9.7)
(4) 重症の不整脈 (心室細動等)	12	(10.6)	0	(0.0)	3	(3.9)	0	(0.0)	15	(7.9)	0	(0.0)	15	(6.6)
(5) 重篤な心不全	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
(6) 肺塞栓症	0	(0.0)	1	(3.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.8)	1	(0.4)
(7) 大動脈解離	5	(4.4)	1	(3.4)	6	(7.8)	1	(14.3)	11	(5.8)	2	(5.6)	13	(5.8)
2 脳血管疾患	84	(74.3)	27	(93.1)	25	(32.5)	6	(85.7)	109	(57.4)	33	(91.7)	142	(62.8)
(1) くも膜下出血	21	(18.6)	7	(24.1)	17	(22.1)	3	(42.9)	38	(20.0)	10	(27.8)	48	(21.2)
(2) 脳出血	38	(33.6)	10	(34.5)	6	(7.8)	3	(42.9)	44	(23.2)	13	(36.1)	57	(25.2)
(3) 脳梗塞	25	(22.1)	10	(34.5)	2	(2.6)	0	(0.0)	27	(14.2)	10	(27.8)	37	(16.4)
(4) 高血圧性脳症	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

(図表1-2-2 脳・心臓疾患の男女別の決定時疾患名の該当状況の分布:公務上)

(正)



(誤)



(図表1－3－1 脳・心臓疾患の職員区分別・生存死亡別・男女別の事案数:公務上)

(正)

職員区分	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (103件)		女性 (27件)		男性 (87件)		女性 (9件)		(190件)		(36件)		(226件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
義務教育学校職員	29	(28.2)	16	(59.3)	27	(31.0)	5	(55.6)	56	(29.5)	21	(58.3)	77	(34.1)
義務教育学校職員以外の教育職員	15	(14.6)	4	(14.8)	14	(16.1)	2	(22.2)	29	(15.3)	6	(16.7)	35	(15.5)
警察職員	18	(17.5)	1	(3.7)	17	(19.5)	0	(0.0)	35	(18.4)	1	(2.8)	36	(15.9)
消防職員	5	(4.9)	0	(0.0)	6	(6.9)	0	(0.0)	11	(5.8)	0	(0.0)	11	(4.9)
電気・ガス・水道事業職員	1	(1.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
運輸事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
清掃事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.1)	0	(0.0)	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
船員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の職員 (一般職員等)	35	(34.0)	6	(22.2)	22	(25.3)	2	(22.2)	57	(30.0)	8	(22.2)	65	(28.8)

(誤)

職員区分	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (113 件)		女性 (29 件)		男性 (77 件)		女性 (7 件)		(190件)		(36件)		(226件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
義務教育学校職員	30	(26.5)	17	(58.6)	26	(33.8)	4	(57.1)	56	(29.5)	21	(58.3)	77	(34.1)
義務教育学校職員以外の教育職員	16	(14.2)	4	(13.8)	13	(16.9)	2	(28.6)	29	(15.3)	6	(16.7)	35	(15.5)
警察職員	22	(19.5)	1	(3.4)	13	(16.9)	0	(0.0)	35	(18.4)	1	(2.8)	36	(15.9)
消防職員	6	(5.3)	0	(0.0)	5	(6.5)	0	(0.0)	11	(5.8)	0	(0.0)	11	(4.9)
電気・ガス・水道事業職員	1	(0.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
運輸事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
清掃事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.3)	0	(0.0)	1	(0.5)	0	(0.0)	1	(0.4)
船員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の職員 (一般職員等)	38	(33.6)	7	(24.1)	19	(24.7)	1	(14.3)	57	(30.0)	8	(22.2)	65	(28.8)

(図表1-4-1 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の職務従事状況※¹:公務上)

(正)


職務従事状況	生存				死亡				男性合計 (190件)		女性合計 (36件)		総計 (226件)	
	男性 (103件)		女性 (27件)		男性 (87件)		女性 (9件)							
	n ^{※2}	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇	7	(6.8)	1	(3.7)	12	(13.8)	0	(0.0)	19	(10.0)	1	(2.8)	20	(8.8)
2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事 (長時間労働)	93	(90.3)	25	(92.6)	69	(79.3)	8	(88.9)	162	(85.3)	33	(91.7)	195	(86.3)
(1) 発症前1週間	20	(19.4)	5	(18.5)	16	(18.4)	2	(22.2)	36	(18.9)	7	(19.4)	43	(19.0)
(2) 発症前1か月間	63	(61.2)	18	(66.7)	44	(50.6)	5	(55.6)	107	(56.3)	23	(63.9)	130	(57.5)
(3) 発症前6か月間	58	(56.3)	16	(59.3)	52	(59.8)	6	(66.7)	110	(57.9)	22	(61.1)	132	(58.4)
3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる 職務従事状況	38	(36.9)	12	(44.4)	40	(46.0)	4	(44.4)	78	(41.1)	16	(44.4)	94	(41.6)
(1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間	7	(6.8)	1	(3.7)	1	(1.1)	0	(0.0)	8	(4.2)	1	(2.8)	9	(4.0)
(2) 騒音、寒冷、暑熱等不快・不健康な勤務環境下	5	(4.9)	2	(7.4)	4	(4.6)	0	(0.0)	9	(4.7)	2	(5.6)	11	(4.9)
(3) 緊急呼出等公務の性質	3	(2.9)	1	(3.7)	4	(4.6)	0	(0.0)	7	(3.7)	1	(2.8)	8	(3.5)
(4) 出張等の勤務公署外における移動を伴う職務	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
(5) 精神的又は肉体的負荷を伴う職務	32	(31.1)	11	(40.7)	35	(40.2)	4	(44.4)	67	(35.3)	15	(41.7)	82	(36.3)
4. その他 ^{※3}	27	(26.2)	4	(14.8)	20	(23.0)	1	(11.1)	47	(24.7)	5	(13.9)	52	(23.0)

(誤)


職務従事状況	生存				死亡				男性合計 (190件)		女性合計 (36件)		総計 (226件)	
	男性 (113 件)		女性 (29 件)		男性 (77 件)		女性 (7 件)							
	n ^{※2}	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇	8	(7.1)	1	(3.4)	11	(14.3)	0	(0.0)	19	(10.0)	1	(2.8)	20	(8.8)
2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事 (長時間労働)	102	(90.3)	27	(93.1)	60	(77.9)	6	(85.7)	162	(85.3)	33	(91.7)	195	(86.3)
(1) 発症前1週間	20	(17.7)	6	(20.7)	16	(20.8)	1	(14.3)	36	(18.9)	7	(19.4)	43	(19.0)
(2) 発症前1か月間	68	(60.2)	20	(69.0)	39	(50.6)	3	(42.9)	107	(56.3)	23	(63.9)	130	(57.5)
(3) 発症前6か月間	67	(59.3)	17	(58.6)	43	(55.8)	5	(71.4)	110	(57.9)	22	(61.1)	132	(58.4)
3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる 職務従事状況	43	(38.1)	13	(44.8)	35	(45.5)	3	(42.9)	78	(41.1)	16	(44.4)	94	(41.6)
(1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間	7	(6.2)	1	(3.4)	1	(1.3)	0	(0.0)	8	(4.2)	1	(2.8)	9	(4.0)
(2) 不健康な勤務環境下	5	(4.4)	2	(6.9)	4	(5.2)	0	(0.0)	9	(4.7)	2	(5.6)	11	(4.9)
(3) 緊急呼出等公務の性質	4	(3.5)	1	(3.4)	3	(3.9)	0	(0.0)	7	(3.7)	1	(2.8)	8	(3.5)
(4) 出張等の勤務公署外における移動を伴う職務	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
(5) 精神的緊張を伴う職務	36	(31.9)	12	(41.4)	31	(40.3)	3	(42.9)	67	(35.3)	15	(41.7)	82	(36.3)
4. その他 ^{※3}	28	(24.8)	4	(13.8)	19	(24.7)	1	(14.3)	47	(24.7)	5	(13.9)	52	(23.0)

(図表1-7-2 脳・心臓疾患の職員区分別の該当状況の分布:公務上)

(正)



(誤)



(図表5-1 脳・心臓疾患の男女別・年齢別の事案数(請求時、発症時、死亡時) (脳心 H13 基準):公務上)

(正)

	男性		女性		総計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性別	179	(84.4)	33	(15.6)	212	(100.0)
請求時年齢 [M, SD]	[47.6, 9.0]		[46.6, 9.3]		[47.4, 9.1]	
発症時年齢 [M, SD]	[46.9, 9.1]		[45.5, 8.7]		[46.7, 9.0]	
29歳以下	8	(4.5)	4	(12.1)	12	(5.7)
30~39歳	28	(15.6)	3	(9.1)	31	(14.6)
40~49歳	62	(34.6)	13	(39.4)	75	(35.4)
50~59歳	72	(40.2)	13	(39.4)	85	(40.1)
60~69歳	8	(4.5)	0	(0.0)	8	(3.8)
70歳以上	1	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.5)
合計	179	(100.0)	33	(100.0)	212	(100.0)
死亡時年齢 [M, SD]	[45.6, 8.9]		[48.0, 5.2]		[45.9, 8.6]	
29歳以下	4	(4.9)	0	(0.0)	4	(4.4)
30~39歳	15	(18.5)	1	(11.1)	16	(17.8)
40~49歳	29	(35.8)	4	(44.4)	33	(36.7)
50~59歳	32	(39.5)	4	(44.4)	36	(40.0)
60~69歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
70歳以上	1	(1.2)	0	(0.0)	1	(1.1)
合計	81	(100.0)	9	(100.0)	90	(100.0)

(誤)

	男性		女性		総計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性別	179	(84.4)	33	(15.6)	212	(100.0)
請求時年齢 [M, SD]	[47.6, 9.0]		[46.6, 9.3]		[47.4, 9.1]	
発症時年齢 [M, SD]	[46.9, 9.1]		[45.5, 8.7]		[46.7, 9.0]	
20~29歳	8	(4.5)	4	(12.1)	12	(5.7)
30~39歳	28	(15.6)	3	(9.1)	31	(14.6)
40~49歳	62	(34.6)	13	(39.4)	75	(35.4)
50~59歳	72	(40.2)	13	(39.4)	85	(40.1)
60~69歳	8	(4.5)	0	(0.0)	8	(3.8)
70歳以上	1	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.5)
合計	179	(100.0)	33	(100.0)	212	(100.0)
死亡時年齢 [M, SD]	[45.6, 9.3]		[49.4 , 4.1]		[46.0 , 9.0]	
20~29歳	4	(5.6)	0	(0.0)	4	(5.1)
30~39歳	14	(19.7)	0	(0.0)	14	(17.9)
40~49歳	23	(32.4)	3	(42.9)	26	(33.3)
50~59歳	29	(40.8)	4	(57.1)	33	(42.3)
60~69歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
70歳以上	1	(1.4)	0	(0.0)	1	(1.3)
合計	71	(100.0)	7	(100.0)	78	(100.0)

(図表5-3 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の決定時疾患名の該当状況(脳心 H13 基準):公務上)

(正)

決定時疾患名	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (98件)		女性 (24件)		男性 (81件)		女性 (9件)		(179件)		(33件)		(212件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1 心・血管疾患	22	(22.4)	2	(8.3)	52	(64.2)	1	(11.1)	74	(41.3)	3	(9.1)	77	(36.3)
(1) 狭心症	2	(2.0)	0	(0.0)	1	(1.2)	0	(0.0)	3	(1.7)	0	(0.0)	3	(1.4)
(2) 心筋梗塞	5	(5.1)	0	(0.0)	22	(27.2)	0	(0.0)	27	(15.1)	0	(0.0)	27	(12.7)
(3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)	2	(2.0)	0	(0.0)	18	(22.2)	0	(0.0)	20	(11.2)	0	(0.0)	20	(9.4)
(4) 重症の不整脈 (心室細動等)	9	(9.2)	0	(0.0)	6	(7.4)	0	(0.0)	15	(8.4)	0	(0.0)	15	(7.1)
(5) 肺塞栓症	0	(0.0)	1	(4.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.0)	1	(0.5)
(6) 大動脈瘤破裂 (解離性大動脈瘤を含む。)	4	(4.1)	1	(4.2)	5	(6.2)	1	(11.1)	9	(5.0)	2	(6.1)	11	(5.2)
2 脳血管疾患	76	(77.6)	22	(91.7)	29	(35.8)	8	(88.9)	105	(58.7)	30	(90.9)	135	(63.7)
(1) くも膜下出血	18	(18.4)	6	(25.0)	20	(24.7)	4	(44.4)	38	(21.2)	10	(30.3)	48	(22.6)
(2) 脳出血	33	(33.7)	7	(29.2)	7	(8.6)	4	(44.4)	40	(22.3)	11	(33.3)	51	(24.1)
(3) 脳梗塞 (脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞)	25	(25.5)	9	(37.5)	2	(2.5)	0	(0.0)	27	(15.1)	9	(27.3)	36	(17.0)
(4) 高血圧性脳症	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

(誤)

決定時疾患名	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (108件)		女性 (26件)		男性 (71件)		女性 (7件)		(179件)		(33件)		(212件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1 心・血管疾患	28	(25.9)	2	(7.7)	46	(64.8)	1	(14.3)	74	(41.3)	3	(9.1)	77	(36.3)
(1) 狭心症	2	(1.9)	0	(0.0)	2	(2.8)	0	(0.0)	4	(2.2)	0	(0.0)	4	(1.9)
(2) 心筋梗塞	8	(7.4)	0	(0.0)	19	(26.8)	0	(0.0)	27	(15.1)	0	(0.0)	27	(12.7)
(3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)	2	(1.9)	0	(0.0)	17	(23.9)	0	(0.0)	19	(10.6)	0	(0.0)	19	(9.0)
(4) 重症の不整脈 (心室細動等)	12	(11.1)	0	(0.0)	3	(4.2)	0	(0.0)	15	(8.4)	0	(0.0)	15	(7.1)
(5) 肺塞栓症	0	(0.0)	1	(3.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.0)	1	(0.5)
(6) 大動脈瘤破裂 (解離性大動脈瘤を含む。)	4	(3.7)	1	(3.8)	5	(7.0)	1	(14.3)	9	(5.0)	2	(6.1)	11	(5.2)
2 脳血管疾患	80	(74.1)	24	(92.3)	25	(35.2)	6	(85.7)	105	(58.7)	30	(90.9)	135	(63.7)
(1) くも膜下出血	21	(19.4)	7	(26.9)	17	(23.9)	3	(42.9)	38	(21.2)	10	(30.3)	48	(22.6)
(2) 脳出血	34	(31.5)	8	(30.8)	6	(8.5)	3	(42.9)	40	(22.3)	11	(33.3)	51	(24.1)
(3) 脳梗塞 (脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞)	25	(23.1)	9	(34.6)	2	(2.8)	0	(0.0)	27	(15.1)	9	(27.3)	36	(17.0)
(4) 高血圧性脳症	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

(図表5-5 脳・心臓疾患の職員区分別・生存死亡別・男女別の事案数(脳心 H13 基準):公務上)

(正)

職員区分	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (98件)		女性 (24件)		男性 (81件)		女性 (9件)		(179件)		(33件)		(212件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
義務教育学校職員	27	(27.6)	15	(62.5)	25	(30.9)	5	(55.6)	52	(29.1)	20	(60.6)	72	(34.0)
義務教育学校職員以外の教育職員	12	(12.2)	4	(16.7)	13	(16.0)	2	(22.2)	25	(14.0)	6	(18.2)	31	(14.6)
警察職員	18	(18.4)	1	(4.2)	17	(21.0)	0	(0.0)	35	(19.6)	1	(3.0)	36	(17.0)
消防職員	5	(5.1)	0	(0.0)	5	(6.2)	0	(0.0)	10	(5.6)	0	(0.0)	10	(4.7)
電気・ガス・水道事業職員	1	(1.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.5)
運輸事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
清掃事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
船員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の職員 (一般職員等)	35	(35.7)	4	(16.7)	21	(25.9)	2	(22.2)	56	(31.3)	6	(18.2)	62	(29.2)

(誤)

職員区分	生存				死亡				男性合計		女性合計		総計	
	男性 (108 件)		女性 (26 件)		男性 (71 件)		女性 (7 件)		(179件)		(33件)		(212件)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
義務教育学校職員	28	(25.9)	16	(61.5)	24	(33.8)	4	(57.1)	52	(29.1)	20	(60.6)	72	(34.0)
義務教育学校職員以外の教育職員	13	(12.0)	4	(15.4)	12	(16.9)	2	(28.6)	25	(14.0)	6	(18.2)	31	(14.6)
警察職員	22	(20.4)	1	(3.8)	13	(18.3)	0	(0.0)	35	(19.6)	1	(3.0)	36	(17.0)
消防職員	6	(5.6)	0	(0.0)	4	(5.6)	0	(0.0)	10	(5.6)	0	(0.0)	10	(4.7)
電気・ガス・水道事業職員	1	(0.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.5)
運輸事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
清掃事業職員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
船員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の職員 (一般職員等)	38	(35.2)	5	(19.2)	18	(25.4)	1	(14.3)	56	(31.3)	6	(18.2)	62	(29.2)

(図表5ー7 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の職務従事状況(脳心 H13 基準):公務上)

(正)

職務従事状況	生存				死亡				男性合計 (179件)		女性合計 (33件)		総計 (212件)	
	男性 (98件) n ^{※2}	(%)	女性 (24件) n	(%)	男性 (81件) n	(%)	女性 (9件) n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇	7	(7.1)	0	(0.0)	11	(13.6)	0	(0.0)	18	(10.1)	0	(0.0)	18	(8.5)
2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事 (長時間労働)	88	(89.8)	24	(100.0)	66	(81.5)	8	(88.9)	154	(86.0)	32	(97.0)	186	(87.7)
(1) 発症前 1 週間	19	(19.4)	4	(16.7)	14	(17.3)	2	(22.2)	33	(18.4)	6	(18.2)	39	(18.4)
(2) 発症前 1 か月間	59	(60.2)	17	(70.8)	41	(50.6)	5	(55.6)	100	(55.9)	22	(66.7)	122	(57.5)
(3) 発症前 6 か月間	54	(55.1)	15	(62.5)	52	(64.2)	6	(66.7)	106	(59.2)	21	(63.6)	127	(59.9)
3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる 職務従事状況	35	(35.7)	11	(45.8)	36	(44.4)	4	(44.4)	71	(39.7)	15	(45.5)	86	(40.6)
(1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間	7	(7.1)	1	(4.2)	1	(1.2)	0	(0.0)	8	(4.5)	1	(3.0)	9	(4.2)
(2) 不健康な勤務環境下	5	(5.1)	1	(4.2)	4	(4.9)	0	(0.0)	9	(5.0)	1	(3.0)	10	(4.7)
(3) 緊急呼出等公務の性質	2	(2.0)	1	(4.2)	4	(4.9)	0	(0.0)	6	(3.4)	1	(3.0)	7	(3.3)
(4) 精神的緊張を伴う職務	28	(28.6)	10	(41.7)	31	(38.3)	4	(44.4)	59	(33.0)	14	(42.4)	73	(34.4)
4. その他 ^{※2}	27	(27.6)	4	(16.7)	17	(21.0)	1	(11.1)	44	(24.6)	5	(15.2)	49	(23.1)

(誤)

職務従事状況	生存				死亡				男性合計 (179件)		女性合計 (33件)		総計 (212件)	
	男性 (108 件) n ^{※1}	(%)	女性 (26 件) n	(%)	男性 (71 件) n	(%)	女性 (7 件) n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇	8	(7.4)	0	(0.0)	10	(14.1)	0	(0.0)	18	(10.1)	0	(0.0)	18	(8.5)
2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事 (長時間労働)	97	(89.8)	26	(100.0)	57	(80.3)	6	(85.7)	154	(86.0)	32	(97.0)	186	(87.7)
(1) 発症前 1 週間	19	(17.6)	5	(19.2)	14	(19.7)	1	(14.3)	33	(18.4)	6	(18.2)	39	(18.4)
(2) 発症前 1 か月間	64	(59.3)	19	(73.1)	36	(50.7)	3	(42.9)	100	(55.9)	22	(66.7)	122	(57.5)
(3) 発症前 6 か月間	63	(58.3)	16	(61.5)	43	(60.6)	5	(71.4)	106	(59.2)	21	(63.6)	127	(59.9)
3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる 職務従事状況	40	(37.0)	12	(46.2)	31	(43.7)	3	(42.9)	71	(39.7)	15	(45.5)	86	(40.6)
(1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間	7	(6.5)	1	(3.8)	1	(1.4)	0	(0.0)	8	(4.5)	1	(3.0)	9	(4.2)
(2) 不健康な勤務環境下	5	(4.6)	1	(3.8)	4	(5.6)	0	(0.0)	9	(5.0)	1	(3.0)	10	(4.7)
(3) 緊急呼出等公務の性質	3	(2.8)	1	(3.8)	3	(4.2)	0	(0.0)	6	(3.4)	1	(3.0)	7	(3.3)
(4) 精神的緊張を伴う職務	32	(29.6)	11	(42.3)	27	(38.0)	3	(42.9)	59	(33.0)	14	(42.4)	73	(34.4)
4. その他 ^{※2}	28	(25.9)	4	(15.4)	16	(22.5)	1	(14.3)	44	(24.6)	5	(15.2)	49	(23.1)